

1. PROTHESENERHALT DAIR

(Debridement, antibiotics, implant retention)

Voraussetzung: Symptombdauer < 3 Wochen, gute Weichteilsituation, feste Prothese, keine problematischen Erreger (dtt)

WOCHEN 0

OP: Debridement und Wechsel der mobilen Teile

WOCHEN 0-2*

intravenöse antiinfektive Therapie

*außer bei Bakteriämie auch kürzere intravenöse Therapie (minimal 1 Woche) nach klinischen und laborchemischen Aspekten möglich

WOCHEN 2-12

orale antiinfektive Therapie (mit Rifampicin bei Staphylokokken)

2. EINZEITIGER WECHSEL

Voraussetzung: gute Weichteilsituation, keine problematischen Erreger (dtt)

WOCHE 0

OP: Debridement und Prothesenwechsel mit sofortiger Reimplantation

WOCHE 0-2*


intravenöse antiinfektive Therapie

*außer bei Bakteriämie auch kürzere intravenöse Therapie (minimal 1 Woche) nach klinischen und laborchemischen Aspekten möglich

WOCHE 2-12

orale antiinfektive Therapie (mit Rifampicin bei Staphylokokken)

3. ZWENZEITIGER WECHSEL - KURZES INTERVALL



4. ZWENZEITIGER WECHSEL - LANGES INTERVALL

WOCHE 0

1. OP: Debridement und Prothesenexplantation, ggf. Einbau eines temporären Platzhalters

WOCHEN 0-2*

Implantatfreie Zeit mit intravenöser antiinfektiver Therapie

*außer bei Bakteriämie auch kürzere intravenöse Therapie (minimal 1 Woche) nach klinischen und laborchemischen Aspekten möglich

WOCHEN 2-6

Implantatfreie Zeit mit oraler antiinfektiver Therapie

WOCHE 7

2. OP Prothesenimplantation und erneute Probenentnahme

WOCHE 7-8

intravenöse antiinfektive Therapie

WOCHEN 8-12

orale antiinfektive Therapie (mit Rifampicin bei Staphylokokken)